



## DES CYGNES DE BEWICK *CYGNUS COLOMBIANUS* AU RÉSERVOIR DE CERCEY

Georges **BEDRINES**

Nicheur en Sibérie arctique, le Cygne de Bewick est un hivernant rare en France, mais régulier sur certains sites (Camargue, grands lacs de Champagne...) (DUBOIS *et al.*, 2008).

La base [www.oiseaux-cote-dor](http://www.oiseaux-cote-dor) fait état de 3 observations antérieures à 2012 :

- 3 ind. du 13 au 17 novembre 1966 à l'étang Rouhey (Thomirey) ;
- 2 ind. le 13 novembre 1994 à l'étang du Milieu (Laperrière-sur-Saône) ;
- 2 ad. et 4 juv. le 29 novembre 2011 sur un étang privé (Auxois).

Etonnamment, les ouvrages anciens (MARCHANT 1869, DAGUIN 1922, DE VOGÜE 1948) ne signalent pas l'espèce, alors qu'ils mentionnent plusieurs données de Cygnes chanteurs *Cygnus cygnus*... mais les 4 dernières observations de cygnes sauvages en Côte-d'Or concernent le Bewick, le chanteur n'ayant plus été noté depuis... 1963 !

### Découverte

Mercredi 7 novembre 2012, il est 9h30 quand j'arrive sur le petit parking du réservoir de Cercey (commune de Thoisy-le-Désert). Décidé à faire le tour du plan d'eau, je commence par me rendre près du grand tilleul sur la digue Sud-Est et comme l'endroit permet d'avoir une bonne vue sur tout le réservoir, j'en profite pour donner là mon premier « coup de jumelles » en commençant par balayer la rive opposée. J'y découvre des Canards colverts *Anas platyrhynchos*, des Sarcelles d'hiver *Anas crecca*, des Fuligules milouins *Aythya ferina*, tous présents en grand nombre et puis, au beau milieu de tous ces canards, c'est la surprise. Je réalise que la dizaine d'oiseaux blancs à laquelle je n'avais pas encore trop prêté attention, pensant qu'il pouvait s'agir de Grandes aigrettes *Casmerodius albus*, est en fait une troupe de petits cygnes. Ils se tiennent à environ 500 mètres en bordure de la vasière de l'autre côté du réservoir.



Cygnes de Bewick (G.Bedrines)

Assez rapidement, leur taille et leur silhouette me font penser aux Cygnes de Bewick que j'avais déjà eu l'occasion d'observer sur les réservoirs de Champagne, l'examen de leur bec à la longue-vue m'en apportera la confirmation. Ils sont neuf, huit adultes et un jeune.

### Description

La silhouette est celle d'un petit cygne au cou plutôt court et assez épais.

Chez les adultes, le plumage est blanc immaculé et le bec est jaune à sa base et noir à son extrémité. La partie jaune, moins étendue que chez le Cygne chanteur, n'atteint pas la narine et son contour est plutôt arrondi.

Le jeune, de taille identique à celle des adultes, a un plumage gris. Son bec est tricolore : noir à l'extrémité et en bordure des deux mandibules, rosâtre sur sa partie centrale et blanchâtre à sa base sur la partie qui deviendra jaune chez l'oiseau devenu adulte.

### Comportement

Durant mes deux heures de présence sur place, les oiseaux ont alterné recherche de nourriture et repos près de la rive. La nourriture était prise sur le fond à une profondeur qui semblait être comprise entre 50 cm et un mètre. Au repos, les oiseaux avaient le cou et la tête sur le dos, le bec était alors en grande partie caché sous les plumes.

Ces paisibles activités n'auront été troublées qu'une fois, lors d'une visite que sont venus leur rendre les

trois Cygnes tuberculés *Cygnus olor* du coin. Partis de loin, ces trois cygnes se sont dirigés droit sur la troupe de Cygnes de Bewick. D'abord lente, leur nage est devenue de plus en plus rapide à mesure qu'ils approchaient des « intrus » et, c'est le plumage gonflé et l'attitude menaçante, qu'ils sont arrivés sur eux. Les oiseaux les moins prompts à déguerpir étaient tour à tour pris en chasse par leurs grands cousins et la troupe a fini par se disloquer.

Suite à cette séance d'intimidation, et malgré le départ de leurs trois assaillants, les Cygnes de Bewick sont restés un bon moment très nerveux : durant cinq bonnes minutes, les oiseaux séparés les uns des autres se sont déplacés en tous sens cou tendu et tête haute en poussant de nombreux cris. Je pense qu'il s'en est peut-être fallu de peu à ce moment-là pour

que les oiseaux ne quittent le réservoir. Il est à noter qu'un tel comportement agressif de la part de Cygnes tuberculés à l'encontre de Cygnes de Bewick avait déjà été observé dans le département en novembre 2011, il s'était alors soldé par le départ de ces derniers (observation d'Emmanuel Payebin).

Heureusement dans le cas présent, ce départ ne s'est pas produit et les neuf Cygnes de Bewick ont ainsi pu être observés jusqu'au 15 novembre.

#### **Remerciements**

Merci à Antoine ROUGERON pour la rédaction de l'introduction et à Emmanuel PAYEBIN pour les informations concernant son observation.

## **BIBLIOGRAPHIE**

DUBOIS P.-J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G., YESOU P. (2008). Nouvel inventaire des oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris. p22.